



Pour une Suisse sans élevage intensif : OUI le 25 septembre ! X

TRAITÉS COMME DE LA MARCHANDISE

Dans la production animale industrielle, les animaux sont considérés comme de la marchandise à optimiser. Les poulets de chair sont engrangés en 30 jours jusqu'à devenir si gras dans leur dernière semaine de vie qu'ils arrivent à peine à se tenir sur leurs pattes. Les vaches laitières ne produisent plus, comme auparavant, 4 000 litres de lait par an, mais plus de 8 000 litres. Les cochons d'aujourd'hui ont deux côtes supplémentaires. Ces modifications génétiques considérées comme « réussies » provoquent d'intenses souffrances et des problèmes de santé pour les animaux.

FAITS ET CHIFFRES



POULE(T)S

Les poules vivent de préférence en groupes de quelques dizaines d'individus. Elles communiquent par des sons et des gestes et ont une hiérarchie bien définie, le coq jouant un rôle de leader et de protecteur. Pour que cela fonctionne, les différents animaux doivent pouvoir s'identifier les uns les autres.

CONDITIONS DE VIE ACTUELLES

LES FAITS ET LES CHIFFRES POUR LES POULE(T)S

Les effectifs d'animaux 2020

78 millions de poulets de chair

3,5 millions de poules pondeuses

Durée de vie

Poulet de chair : 5 semaines

Poule pondeuse : 1,5 an



Jusqu'à 27 000 poulets de chair par halle
Jusqu'à 18 000 poules pondeuses par halle

Élevage sélectif cruel

Au cours de leur dernière semaine de vie, les poulets de chair sont si gras qu'ils peuvent à peine se tenir sur leurs pattes. Beaucoup développent des lésions aux jambes ou des problèmes cardio-vasculaires, car le cœur n'irrigue plus correctement leur corps surdimensionné. Une étude récente montre que 97 % des poules pondeuses souffrent de fractures parce que, du fait de la ponte constante d'œufs, leur corps n'a plus assez de calcium pour leurs os.

Espace disponible

En règle générale, un poulet de chair ne dispose que de peu d'espace pour vivre : environ l'équivalent d'une feuille A4.

Accès à l'extérieur

Seuls 8 % des poulets de chair voient le ciel durant leur vie.

Hébergement

Seuls 20 % du bâtiment doivent être recouverts de litière. Dans les halles où se trouvent des milliers d'animaux, il est (presque) impossible de leur accorder un soin individuel.

Troubles comportementaux


Les poules pondeuses sont épointées – une procédure douloureuse pour l'animal qui consiste à raccourcir le bec supérieur sans anesthésie. Cette mesure est prise parce que le picage des plumes entre les poules est fréquent dans les grands groupes. Ce comportement peut dégénérer jusqu'au cannibalisme.

Mort prématurée

Jusqu'à 4% des poulets de chair meurent déjà dans la halle. Chez les races de poules pondeuses, les poussins mâles sont gazés le jour même de leur



de biogaz pour la production d'énergie.



COCHONS

Les porcs sont des animaux curieux et joueurs, dotés de capacités cognitives très développées. Ils vivent en petits groupes et se retirent avant la naissance pour construire un nid pour leurs porcelets. Ensuite, la mère reste avec les porcelets pour s'occuper d'eux et les protéger.

CONDITIONS DE VIE ACTUELLES